

Reconocimiento de la Política de Inmunizaciones

Como especialistas quienes estudian, entrenan y proveen cuidado a niños y adolescentes, completamente aceptamos las recomendaciones de la Academia Americana de Pediatría (AAP), Consejo Americano sobre Prácticas de Inmunizaciones (ACIP), y el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). Inmunizaciones son la manera más eficaz para asegurar la salud de niños de enfermedades serias y contagiosas.

Reconocemos que los padres tienen un papel importante en las decisiones del cuidado de la salud en cuanto a sus hijos, incluso inmunizaciones. Mientras respetamos las decisiones de los padres en cuanto a inmunizaciones, también somos responsables para la seguridad de todos pacientes que vienen a la clínica, especialmente en cuanto a exposición a enfermedades contagiosas mientras en nuestra oficina.

Sarampión es el virus más contagioso que presenta un riesgo a niños. Una persona o niño con sarampión es contagioso por 24 horas antes de desarrollar síntomas. Aún más, el virus se transmite rápido por un hogar, un edificio, una clínica, u otro lugar público. Sarampión se suspende en el aire y pasará por sistemas de ventilación, aún después de que el individuo afectado haya salido del edificio y se queda en circulación por varias horas después.

Los riesgos de sarampión incluyen:

- La muerte de 3 de cada 1,000 niños infectados por sarampión
- Encefalitis — infección viral del cerebro que llega a daño cerebral permanente en 1 de cada 1,000 personas con sarampión
- Infección bacteriano secundario de sepsis de la sangre y neumonía en los pulmones
- Función reprimida de la sistema inmune por meses después de sarampión que llega a una subida de infecciones bacterianos y virales
- SSPE (subacute sclerosing panencephalitis), una condición rara que llega a deterioro del cerebro, convulsiones severas que ocurren 7-10 años después de sarampión en hasta 7 de cada 100,000 personas que fueron afectados por sarampión

Después de mucho pensamiento, balanceando las decisiones personales de familias en cuanto a vacunar o no frente al riesgo de adquirir una enfermedad prevenible dentro de nuestra oficina, los médicos clínicos de la Clínica Pediátrica de Salem están animando seriamente a todos niños recibir inmunizaciones contra sarampión después de la edad de 12 meses como es la recomendación. Les pediremos a los niños que no tienen su primera inmunización de sarampión, paperas y rubeola (MMR) antes de la edad de 24 meses buscar cuidado médico en otro lugar. Les permitiremos a los niños mayores que no han recibido o cumplido su inmunización MMR un tiempo de seis meses para cumplir las dos vacunas de MMR como requerido para promover inmunidad.

La única excepción será para niños con una contraindicación médica documentada como reconocido por el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), la Academia Americana de Pediatría (AAP) y el Consejo Americano sobre Prácticas de Inmunizaciones (ACIP).

Por favor, discute cualquier preocupación con el Proveedor del Cuidado Primario de su(s) hijo(s).

HE LEÍDO Y ENTIENDO LA POLÍTICA DE INMUNIZACIONES.

Firmado por _____

Fecha _____

Nombre en letras de molde _____

Relación al Paciente _____

Nombre del Paciente _____

Fecha de Nacimiento del Paciente _____



Salem Pediatric Clinic
La Clínica Pediátrica de Salem

2478 13th Street SE
Salem, Oregon 97302
503-362-2481 · Phone
503-371-7803 · Fax
SalemPediatricClinic.com